

ADVIES VOOR TANDARTSEN

Versie 16 maart 2020

1. Context

Er is momenteel **wijdverspreide transmissie van het SARS-CoV-2** in België. Dat wil zeggen dat het niet langer mogelijk is om risicogroepen te identificeren op basis van reisgeschiedenis. De overheid heeft daarom maximaal ingezet op social distancing maatregelen. Het SARS-CoV-2 virus wordt voornamelijk overgedragen door druppelinfectie. Personen die niet hoesten of niezen zijn daarom doorgaans slechts weinig besmettelijk, ook als het virus aantoonbaar is op een keelwisser.

Voor de algemene bevolking geldt het advies om zoveel mogelijk onnodig sociaal contact te vermijden en thuis te blijven indien ze symptomen vertonen. Huisartsen moeten voor personen met respiratoire symptomen zoveel mogelijk via telefonische consultatie werken en enkel een klinisch onderzoek uitvoeren indien ze beschikken over chirurgische maskers en handschoenen.

2. Maatregelen voor de tandarts

De tandarts bevindt zich in een specifieke positie, aangezien tandheelkundige apparaten zoals turbines en tandsteenapparatuur aerosolen veroorzaken. Een chirurgisch masker beschermt de tandarts onvoldoende tegen aerosolen.

Algemeen :

Daarom is het aangewezen dat:

- patiënten gevraagd worden om telefonisch contact op te nemen indien zij symptomen vertonen
- niet-dringende behandelingen uitgesteld worden

Voor **élke patiënt met respiratoire symptomen** (ook milde symptomen)

- niet-dringende behandelingen moeten uitgesteld worden
- indien de patiënt zich in de praktijk aanbiedt, moet hij zo snel mogelijk geïsoleerd worden
- voor dringende behandelingen
 - moet de patiënt geïsoleerd worden (ruimtelijk of in de tijd) van andere patiënten
 - dient de tandarts zich te beschermen met een FFP2-masker, schort, handschoenen en spatbril alvorens de behandeling uit te voeren
 - indien hij niet over deze beschermingsmiddelen beschikt, dient hij de patiënt te verwijzen naar een collega voor de nodige zorgen. De collega dient verwittigd te worden van de komst van de patiënt.

Voor asymptomatische patiënten:

- een mondspoeling met waterstofperoxide 1% of povidone 0,2% en/of het gebruik van een rubber dam, gecombineerd met een goede afzuiging, kunnen de productie van infectieuze aerosolen beperken¹
- het verdient aanbeveling om zich voor alle patiënten te beschermen met FFP2-masker, spatbril, schort en handschoenen bij het uitvoeren van aerosol-genererende procedures
- bij procedures waar geen aerosolen vrijkomen, volstaat bescherming met een chirurgisch masker, spatbril en handschoenen

Uiteraard gelden de algemene hygiënische maatregelen voor de bevolking ook voor de tandarts. Dat houdt onder meer in dat de tandarts thuis blijft indien hij/zij respiratoire symptomen vertoont (ook milde).

In samenwerking met:



¹ Peng X et al. International Journal of Oral Science (2020)12 ;9 <https://doi.org/10.1038/s41368-020-0075-9>